

Tại sao cần kiểm tra sau thời gian quan hệ mang gái mại dâm?

Quan hệ không sử dụng bao cao su có thể mắc những căn bệnh lây truyền qua quan hệ tình dục tình dục đó là nhiễm trùng, lậu, bệnh mồng gà, bệnh giang mai, viêm gan B, HIV...



Đủ thứ căn bệnh từ mại dâm

Quan hệ tình dục không được bảo vệ là căn nguyên dẫn tới nhiều căn bệnh xã hội vô cùng hiểm nguy. Trong đó, tỷ lệ viêm HIV cũng thí dụ các bệnh xã hội thông qua việc giao hợp mang gái mại dâm cao hơn gấp nhiều so mang những nhóm bệnh nhân khác.

- [Khám bệnh xã hội ở đâu tốt nhất](#)
- [Xét nghiệm bệnh xã hội bao nhiêu tiền](#)
- [Điều trị bệnh lậu mãn tính ở đâu](#)
- [Chữa bệnh sùi mào gà ở đâu](#)
- [Điều trị bệnh giang mai ở đâu](#)

Theo chuyên gia Lương T.Phương Nam, [trung tâm y tế Đa khoa Hà Nội](#), bệnh xã hội là những căn bệnh lý hiểm nguy, có khả năng lây lan nhanh chóng, chủ yếu qua những đường quan hệ tình dục không an toàn. Theo thống kê, bây giờ có tới 20 cái bệnh xã hội: bệnh bệnh lậu, bệnh mồng gà, giang mai, nhọt rộp sinh dục, HIV,...

Bệnh hoa liễu phần nhiều lây truyền qua những con đường chính như:

Quan hệ không sử dụng bao cao su sở hữu các người bệnh mắc các bệnh xã hội khác, đặc biệt là gái mại dâm;

Sử dụng chung đồ dùng cá nhân mang các người đang nhiễm bệnh xã hội;

Bà bầu mắc phải có thể truyền nhiễm cho cu qua con đường nhau thai hoặc đang sinh sản tự nhiên;

Dùng chung bơm kim tiêm hay nhận huyết từ bệnh nhân có với bệnh xã hội trong bệnh nhân.

Các bệnh tình dục này nếu không được trợ giúp hiệu quả sẽ làm cho bệnh rất lớn hơn, lan sang các bộ phận không giống, dẫn đến bệnh vô sinh hiếm muộn, có thể còn đe dọa tính mệnh của đối tượng.

Giao hợp với gái mại dâm là 1 trong các nguyên nhân dẫn tới căn bệnh sùi mào gà. Theo bác sĩ Phương Nam khi giao hợp sở hữu gái bán dâm các bác sĩ lưu ý người bệnh cần phải đi xét nghiệm liền do vì những dịch vụ sản xuất mại dâm ngày càng rất nhiều lần, đây chủ yếu là 1 hình thức lây truyền bệnh tình dục rất nguy hiểm. Sở dĩ quan hệ sở hữu gái bán dâm có thể truyền nhiễm bệnh hoa liễu do những nguyên do sau:

Mình các cô gái thực hiện nghề gái bán dâm mắc bệnh hoa liễu đó là bệnh lậu, bệnh giang mai, HIV, ... Thì khả năng những đàn ông có quan hệ tình dục với cô gái này lây truyền bệnh là siêu cao, chừng khoảng 90%.

Bán dâm thường có giao hợp với rất nhiều lần đối tượng không giống, cô gái này có xác suất mắc phải viêm bệnh tình dục từ các người bệnh khác và lây lan căn bệnh giúp những đối tượng quan hệ tình dục với mình.

Các bệnh hoa liễu thường có thời gian ủ căn bệnh dài-ngắn không giống nhau và thường không có bất cứ biểu hiện gì trong suốt tầm thời gian đó. Bởi vậy, có thể thời gian giao hợp cả hai tương đối vô tư và xem nhẹ không sử dụng các phương pháp được bảo vệ.

Xét nghiệm HIV như là thế nào?

Với vi rút gây ra các bệnh hoa liễu có khá nhiều trong huyết, trong các dưỡng chất dịch sinh dục, bởi vậy, vi rút có khả năng tấn công vào máu

đối tác qua cơ quan sinh dục. Vấn đề sinh hoạt tình dục, luôn quan hệ tình dục chỉ va chạm bộ phận sinh dục, đều dẫn tới khả năng lây nhiễm.

Thời điểm giao hợp dương vật-hậu môn là con đường dễ truyền nhiễm viêm nhất, vì "cửa sau" và trực tràng không có dịch trơn như âm đạo nên vô cùng dễ xây chà xát, khiến vi khuẩn HIV, HPV... dễ truyền từ người này sang người bệnh kia.

Cùng với chảy, ví như bạn hôn âm hộ của gái mại dâm bạn sẽ có 2 khả năng như là trường hợp bạn hôn nhưng mà chưa đến sâu thì xác suất lây nhiễm trùng là cực kỳ thấp, còn trường hợp bạn hôn sâu tới và bạn đang gặp phải lở loét mồm, ra máu chân răng,... và có đụng chạm mang sinh dục của cô gái đó thì bạn đã mắc phải viêm HIV, bệnh sùi mào gà.

Chuyên gia Phương Nam cho biết, sau thời gian nhiễm trùng HIV, đối tượng sẽ trải qua 3 giai đoạn: thời kỳ cửa sổ (3-6 tháng đầu), giai đoạn HIV không dấu hiệu, quá trình AIDS. Trong thời kỳ cửa sổ thì có đến 80% số người nhiễm phải không có biểu hiện gì, 20% bệnh nhân có các dấu hiệu không điển hình thí dụ đau đầu, đau vùng họng, mỏi mệt, đau cơ khớp... Nhưng những dấu hiệu đó không đặc trưng cần phải không thể dựa đến ấy để có thể kết luận có nhiễm trùng HIV hay không nên.

1 bệnh nhân có thể có toàn bộ những "dấu hiệu HIV" nhưng thật ra lại không mắc phải, và có nhiều bệnh nhân hoàn toàn không có dấu hiệu gì, nhưng xét nghiệm lại tậu ra là có HIV trong cơ thể-thì có nghĩa là có mắc phải lây viêm.